

DISTRIBUTIONS DE PARETO: INTÉRÊTS ET LIMITES EN RÉASSURANCE

PAR CLAUDE HUYGHUES-BEAUFOND
Assurances Générales de France, Paris, France

ABSTRACT

Instead of determining for a fire insurance portfolio the loss distribution purely based on the claims experience, we try to determine it based on the sums insured.

KEYWORDS

Loss distribution based on sums insured; Pareto distribution.

INTRODUCTION

Au lieu d'estimer, sur la base unique des sinistres, leur loi de distribution, on va essayer de le faire sur la base du profil du portefeuille qui les génère.

En Assurances Décès, s'il n'y a pas de relation entre le capital garanti en cas de décès et l'âge de l'assuré, les sinistres sont distribués comme le sont les capitaux assurés.

En Assurance Dommages, ce n'est généralement pas le cas.

Par exemple, si les risques assurés d'une compagnie sont distribués sur une loi de Pareto tronquée au plein de souscription, que la distribution des taux de dommages vérifie certaines propriétés acceptables, alors les sinistres ne sont pas issus d'une distribution tronquée de Pareto.

CADRE DE NOTRE ÉTUDE

Les hypothèses utilisées sont celles implicitement admises par les réassureurs :

- Le portefeuille assuré comprend N risques $(R_i)_{i=1, \dots, N}$ de valeurs assurées $(K_i)_{i=1, \dots, N}$.
- Le portefeuille est stable dans le temps sur les m dernières années (nombre de polices par tranche de capitaux assurés) et pour l'année $m+1$.
- Pendant chacune de ces dernières années, et pour l'année $m+1$, pour chacun des N risques :
 - Si $(s_{ij})_{j=1, \dots, n_i}$ désignent les n_i sinistres sur le risque i , $p(n_i = 0) = \exp(-p_i) = \exp(-p)$
 - $\forall t$ dans $[0, 1]$, $\forall i, \forall j$, $p[(s_{ij}/K_i) \leq t] = T(t)$ ne dépend pas de i et de j .

- T est une fonction continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $[0, 1]$ strictement croissante sur $[0, 1]$
- n_i suit une loi de Poisson de paramètre p .
- Les sinitres survenant sont indépendants les uns des autres.

N.B. : Les hypothèses sur la fonction de distribution T de taux de dommages et sur la fréquence p sont assez restrictives.

On pourrait, sans trop de difficultés, les rendre moins contraignantes en écrivant que les risques i souscrits se caractérisent ainsi : ils sont issus d'une communauté M de risques I pour lesquels nous avons :

1. $\forall I, n_I$ suit une loi de Poisson de paramètre p_I .
2. $\forall I, \forall j, \forall t, p([s_{ij}/K_I] \leq t) = T_I(t)$ ne dépend que de I .
3. Il n'y a pas de corrélation entre p_I et K_I , d'une part, entre T_I et K_I d'autre part, ou encore :

$$\forall (a, b) \ a < b,$$

$$E_M(p_I/[K_I \in [a, b]]) = p \text{ ne dépend pas de } [a, b]$$

$$E_M(T_I(t)/[K_I \in [a, b]]) = T(t) \text{ ne dépend pas de } [a, b]$$

Alors, toutes les espérances écrites par la suite subsistent ; elles sont des espérances d'espérances conditionnelles.

Les contraintes ainsi exposées n'altèrent en rien la latitude d'acceptation de l'assureur ni son niveau d'acceptation, notamment lorsqu'il y a beaucoup de coassurance.

PROBLÈME

On cherche à déterminer la loi L_x du nombre de sinistres supérieurs à x .

Montrons, dans un premier temps, que L_x est une loi de Poisson dont il suffira de connaître la moyenne \bar{L}_x (E. STRAUB, 1971).

- Pour un risque i ,

$$L_{ix} \text{ suit une loi de Poisson de paramètre } p \left[1 - T \left[\min \left(1, \frac{x}{K_i} \right) \right] \right]$$

— C'est évident si $x > K_i$.

— Si $x \leq K_i$, alors :

$$\begin{aligned} p[L_{ix} = n] &= \sum_{j=n}^{+\infty} \binom{j}{n} \exp(-p) \frac{p^j}{j!} T\left(\frac{x}{K_i}\right)^{j-n} \left[1 - T\left(\frac{x}{K_i}\right) \right]^n \\ &= \exp(-p) \frac{p^n}{n!} \left[1 - T\left(\frac{x}{K_i}\right) \right]^n \sum_{j=n}^{\infty} \frac{p^{j-n}}{(j-n)!} T\left(\frac{x}{K_i}\right)^{j-n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \exp(-p) \exp \left[p T \left(\frac{x}{K_i} \right) \right] \left[p \left[1 - T \left(\frac{x}{K_i} \right) \right] \right]^n \frac{1}{n!} \\
 &= \exp \left[- \left[p \left(1 - T \left(\frac{x}{K_i} \right) \right) \right] \right] \left[p \left[1 - T \left(\frac{x}{K_i} \right) \right] \right]^n \frac{1}{n!}
 \end{aligned}$$

- Pour chaque risque i ,

$$L_{ix} \text{ suit une loi de Poisson de paramètre } p \left[1 - T \left[\min \left(1, \frac{x}{K_i} \right) \right] \right]$$

- $L_x = \sum_i L_{ix}$. Les L_{ix} étant indépendantes,
- L_x suit une loi de Poisson de paramètre

$$p \sum_i \left[1 - T \left[\min \left(1, \frac{x}{K_i} \right) \right] \right] = \bar{L}_x = L(x)$$

L'APPROCHE DES RÉASSUREURS

Pour évaluer le coût d'une couverture en excédent de sinistres, l'assureur et le réassureur ont besoin de connaître $L(x)$, l'espérance mathématique du nombre de sinistres supérieurs à x . Pour cela, on va passer du cas discret évoqué précédemment au cas continu.

Ainsi, la prime pure requise pour une couverture A vs B est-elle :

$$P = AL(A+B) - \int_B^{A+B} (x-B) \frac{dL(x)}{dx} dx$$

- Distribution des capitaux assurés :
- On supposera que les risques sont distribués en montant, sur une loi de Pareto de paramètre α pour $K > c$, c étant fixé. On montrera, sur un exemple en annexe, que cette hypothèse est acceptable.

De la connaissance de la valeur certaine N_c , nombre de risques supérieurs à c , on estime N_x :

$$\hat{N}_x = N_c \left(\frac{c}{x} \right)^\alpha$$

[Si, lors de l'estimation, $\hat{\alpha}$ est non biaisé, alors \hat{N}_x surestime en moyenne N_x .

En effet, $\hat{N}_x = N_x \left(\frac{c}{x} \right)^\varepsilon$ avec $E(\varepsilon) = 0$.

$$E \left[\left(\frac{c}{x} \right)^\varepsilon \right] = E \left(\exp \left(\varepsilon \ln \frac{c}{x} \right) \right) \geq \exp \left[E \left(\varepsilon \ln \left(\frac{c}{x} \right) \right) \right] = 1$$

- Calcul de $L(x)$:

$$\begin{aligned} L(x) &= \int_x^{+\infty} - \frac{dN_u}{du} p \left[1 - T \left(\frac{x}{u} \right) \right] du \\ &= \int_x^{+\infty} \alpha N_c \frac{c^\alpha}{u^{\alpha+1}} p \left[1 - T \left(\frac{x}{u} \right) \right] du \\ &= \int_x^{+\infty} N_c \frac{c^\alpha}{u^{\alpha+2}} pxt \left(\frac{x}{u} \right) du \end{aligned}$$

après intégration par partie.

Par ailleurs $L'(x) = -\alpha N_c \frac{c^\alpha}{x^{\alpha+1}} p[1 - T(1)] - \int_x^{+\infty} p\alpha N_c \frac{c^\alpha}{u^{\alpha+2}} t \left(\frac{x}{u} \right) du$

soit $L'(x) = -\frac{\alpha}{x} L(x)$ ou encore $L(x) = x^{-\alpha} a^\alpha L(a), \forall a \geq c$

(t désigne la dérivée de T).

On rappelle ici que, si $F(x) = \int_c^x f(x, u) du$, et que la différentielle df de f

existe, alors F' existe et $F'(x) = f(x, x) + \int_c^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, u) du$.

- *Intérêt d'une telle formule :*

T et p existent mais sont inconnus. On va revenir à l'expérience du passé et estimer :

$$\begin{aligned} L(a) \text{ par } \hat{L}(a) &= \frac{\text{nombre de sinistres survenus supérieurs à } a \text{ en } m \text{ années}}{m} \\ &= \frac{m_a}{m} \end{aligned}$$

pour tout $a \geq c$.

On choisit a le plus faible possible pour minimiser $\frac{\sigma[L(y)]}{L(y)} = \frac{1}{\sqrt{L(y)}}$

On prend donc $a = c$.

En effet, l'erreur relative sur $L(x)$ est d'autant plus faible qu'est faible l'erreur relative sur $L(a)$.

($\sigma[L(y)]$ désigne l'écart type de Ly).

● *Tarification :*

— Fréquence de sinistres supérieurs à B :

$$\hat{f}_B = f_c \left(\frac{c}{B} \right)^\alpha$$

— Coût moyen d'un sinistre $d'xs$.

Coût moyen d'un sinistre supérieur à B : pour $\alpha > 1$

$$\begin{aligned} c_m(B) &= \int_B^{+\infty} (x - B) dF_\alpha(x) / [1 - F_\alpha(B)] \\ &= \int_B^{+\infty} [1 - F_\alpha(x)] dx / [1 - F_\alpha(B)] \\ &= \int_B^{+\infty} \frac{x^{-\alpha}}{a^{-\alpha}} dx / [1 - F_\alpha(B)] = \frac{B}{\alpha - 1} \end{aligned}$$

— Coût moyen d'un sinistre $d'xs$:

$$\begin{aligned} c_m(A, B) &= c_m(B) - \frac{1 - F_\alpha(A + B)}{1 - F_\alpha(B)} c_m(A + B) \\ &= \frac{B}{\alpha - 1} - \frac{A + B}{\alpha - 1} \left(\frac{B}{A + B} \right)^\alpha \end{aligned}$$

— Estimation de la prime pure requise :

$$\hat{p} = \frac{m_c}{m} \left(\frac{c}{B} \right)^\alpha \frac{B}{\alpha - 1} \left[1 - \left(\frac{B}{A + B} \right)^{\alpha - 1} \right]$$

Cette formule reste vraie pour $0 < \alpha < 1$.

Il suffit d'écrire

$$[1 - F_\alpha(B)] C_m(A, B) = \int_B^{A+B} (x - B) dF_\alpha(x) + A [1 - F_\alpha(A + B)]$$

Pour $\alpha = 1$

$$P = \frac{m_c}{m} \frac{c}{B} B \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \left[1 - \left(\frac{B}{A+B} \right)^\varepsilon \right] = \frac{m_c}{m} c \ln \left(\frac{B+A}{B} \right)$$

Le grand avantage de cette formulation réside dans la disparition de p et de T .

Le réassureur ne peut estimer p car il ne connaît que les sinistres supérieurs à un certain seuil s , qu'on a supposé ici inférieur à c . Pour les mêmes raisons, il ne peut estimer T .

A fortiori, dans l'hypothèse d'hétérogénéité, on ne peut estimer p_i et T_i pour chaque i , d'autant plus qu'on ne connaît pas les fonctions de structures de (p) et (T).

CRITIQUE DE LA MÉTHODE

On a supposé que T existait, mais était inconnue (si T était connu, $L(x)$ le serait immédiatement).

Des fonctions T circulent chez les réassureurs, sans qu'ils sachent bien lesquelles utiliser.

La méthode précédemment décrite a l'énorme avantage de ne pas requérir la connaissance de T .

Malheureusement, elle présente un énorme défaut. $L(x)$ est calculé en écrivant $N_x = N_c \left(\frac{c}{x} \right)^\alpha$ pour tout x et même si x est supérieur à F , le plein de souscription.

Or $N_y = 0$ pour $y > F$. Il nous faut donc, au mieux, utiliser une loi de Pareto tronquée au point F . On supposera donc que toute la densité de risques supérieurs à F , suivant l'hypothèse paretienne, est concentrée en F , après dégageage par exemple en FacultatIVES *proportionnelles*.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, } L(y) &= \int_y^F \frac{-dN_u}{du} p \left[1 - T \left(\frac{y}{u} \right) \right] du + N_c \left(\frac{c}{F} \right)^\alpha p \left[1 - T \left(\frac{y}{F} \right) \right] \\ &= \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad + \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ & \qquad \qquad \qquad L_1(y) \qquad \qquad \qquad + \qquad \qquad \qquad L_2(y) \end{aligned}$$

En intégrant par partie,

$$\begin{aligned} L_1(y) &= -N_{FP} \left[1 - T \left(\frac{y}{F} \right) \right] + \int_y^F y N_u / u^2 p t \left(\frac{y}{u} \right) du \\ L'_1(y) &= \frac{dN_u}{du} (y) p \left[1 - T \left(\frac{y}{y} \right) \right] + \int_y^F \frac{dN_u}{du} \frac{p}{u} t(y/u) du \\ &= -\alpha \int_y^F p \frac{N_u}{u^2} t \left(\frac{y}{u} \right) du \end{aligned}$$

soit $\frac{y}{\alpha} L_1'(y) = -L_1(y) - N_c \left(\frac{c}{F}\right)^\alpha p \left[1 - T\left(\frac{y}{F}\right)\right]$

En posant $L_1(y) = \phi(y)y^{-\alpha} N_c \left(\frac{c}{F}\right)^\alpha p$

$L_1'(y) = \frac{\phi'(y)}{\phi(y)} L_1(y) - \frac{\alpha}{y} L_1(y)$

soit $\phi'(y) = -\alpha y^{\alpha-1} \left[1 - T\left(\frac{y}{F}\right)\right]$

soit $\phi(y) = \phi(F) + \alpha \int_y^F u^{\alpha-1} \left[1 - T\left(\frac{u}{F}\right)\right] du$

La condition $\phi(F) = 0$ [car $L(F) = 0$ puisque $T(u) = 1 \Rightarrow u = F$] nous indique que :

$L_1(y) = \alpha \left[\int_y^F u^{\alpha-1} \left[1 - T\left(\frac{u}{F}\right)\right] du \right] y^{-\alpha} N_c \left(\frac{c}{F}\right)^\alpha p$

et

$L(y) = \left[\int_y^F u^{\alpha-1} \left[1 - T\left(\frac{u}{F}\right)\right] du \right] \alpha y^{-\alpha} + \left[1 - T\left(\frac{y}{F}\right)\right] N_c \left(\frac{c}{F}\right)^\alpha p$

Exemple: Prenons

- $\alpha = 2$ pour $x > 1$ M FRF.
- $t(u) = 1$ sur $[0, 1]$
- $p = 1\%$; 10.000 risques de valeurs assurées > 1 M FRF.
- $F = 10$ M FRF.

$$L_1(y) = - \int_y^F p \frac{d}{du} \left[10.000 \left(\left(\frac{10}{u} \right)^6 \right)^2 \right] \left(1 - \frac{y}{u} \right) du$$

$$= 10^{13} \left[\frac{1}{3y^2} - \frac{1}{F^2} + \frac{2y}{3F^3} \right]$$

On a supposé 10.000 risques > 1 M FRF. Or, on n'en dénombre ici que 9.900 = 10.000 $\times F_\alpha$ (10 M FRF).

Supposons, au pire, que les 100 risques « manquants » se situent en F comme on l'a fait précédemment.

Alors $L(y)$, espérance du nombre de sinistres supérieurs à y , s'écrit :

$$L(y) = L_1(y) + [1 - F_\alpha(F)] N_c p \left[1 - T \left(\frac{y}{F} \right) \right]$$

Pour notre exemple, $L(y) = L_1(y) + 0,1 \left[1 - \frac{y}{F} \right]$

TABLEAU RÉCAPITULATIF

x	$L(x)$ (1)	$L_1(x)$ avec troncation	$L(x)$ (2)	(2)/(1)
1.000.000	3,3	3,2	3,3	≈ 100 %
2.000.000	0,83	0,74	0,82	98,7 %
3.000.000	0,37	0,29	0,36	97,3 %
4.000.000	0,21	0,14	0,20	95,2 %
5.000.000	0,13	0,06	0,11	85 %
6.000.000	0,093	0,033	0,073	78 %
7.000.000	0,068	0,015	0,045	66 %
8.000.000	0,052	0,006	0,026	50 %
9.000.000	0,041	0,001	0,011	27 %
10.000.000	0,033	0	0	0 %

La prise en compte de la troncation (2) modifie donc la loi de Pareto des sinistres (1). Les sinistres ne sont alors plus distribués sur une loi de Pareto.

Intuitivement, cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas de générations de risques supérieurs à F pour remplacer ceux qui disparaissent (ceux $< x$). Cette modification peut être déterminante.

CONCLUSION

A travers cet exemple, force est de constater que la connaissance d'un profil de portefeuille, d'une espérance de sinistres en nombre à un seuil suffisamment bas pour que l'expérience nous en donne un bon indicateur ne suffisent par à déterminer une espérance (en nombre de sinistres) de sinistres importants qui pourraient affecter lourdement le compte d'exploitation d'un assureur.

La connaissance de la loi de distribution des taux de dommages des riches en portefeuille s'avère nécessaire.

ANNEXE 1

Estimation de α

1^{er} cas

Les valeurs assurées des J risques K_1, K_2, \dots, K_J des risques supérieurs à c sont connues.

La vraisemblance $V(K_1, K_2, \dots, K_J, \alpha)$ de notre échantillon s'écrit :

$$V = \prod_{i=1}^J \left[\alpha \left(\frac{c}{K_i} \right)^\alpha \times \frac{1}{K_i} \right] = \alpha^J c^{\alpha J} \left[\prod_{i=1}^J K_i \right]^{-1-\alpha}$$

En maximisant le logarithme de V , $\left[\frac{\partial}{\partial \alpha} [\ln V((K_i), \hat{\alpha})] = 0 \right]$,

nous obtenons:
$$\hat{\alpha} = \frac{J}{\sum_i \ln \left(\frac{K_i}{c} \right)}$$

- On peut montrer que $\hat{\alpha}$ est asymptotiquement non biaisé (METTE RYTGAARD, 1989).
- $\hat{\alpha}$ est une fonction continue de (K_1, \dots, K_J) .

2^e cas

On ne connaît, en général, que le nombre de polices par tranche de capital assuré, pour les risques supérieurs à c .

Tranche	Numéro de tranche	Nombre de risques
$A_0 - A_1$	1	n_1
$A_i - A_{i+1}$	$i+1$	n_{i+1}
$A_{m-1} - + \infty$	m	n_m
Σ		N

On va procéder par étapes pour estimer $\hat{\alpha}$ en utilisant la continuité de $\phi: (K_1, \dots, K_J) \rightarrow \hat{\alpha}(K_1, \dots, K_J) = \phi(K_1, \dots, K_J)$ en utilisant l'estimateur du Khi-deux minimum, par l'algorithme de NEWTON-RAPHSON.

Première étape

On répartit dans chacune des tranches les risques uniformément.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } i < m, \text{ les } n_i \text{ risques valent } B_{ij} = A_{i-1} + \frac{j}{n_i} (A_i - A_{i-1}). \\ \text{Pour } i = m, \text{ les } n_m \text{ risques valent } A_{m-1}. \end{array} \right.$$

Pour $j = 1 \dots n_j$.

On en déduit $\hat{\alpha}_1$, puisqu'on s'est ramené au premier cas.

Deuxième étape

On calcule, sous l'hypothèse, $\alpha = \hat{\alpha}_1$, les fréquences théoriques de chacune des m tranches de capital assuré.

$$\text{Pour } j = 1 \dots m, P_{th_j}(\hat{\alpha}_1) = F_{\hat{\alpha}_1}(A_j) - F_{\hat{\alpha}_1}(A_{j-1}) \quad \text{avec } A_m = +\infty$$

Troisième étape

On écrit $\hat{\alpha}_2 = \hat{\alpha}_1 + \varepsilon$.

$\hat{\alpha}_2$ doit être un meilleur estimateur que $\hat{\alpha}_1$. ε doit être « petit » compte tenu de la continuité de ϕ .

$$\text{On écrit alors } P_{th_i}(\hat{\alpha}_2) = P_{th_i}(\hat{\alpha}_1) + \varepsilon \frac{\partial P_{th_i}}{\partial \alpha}(\hat{\alpha}_1), \text{ au premier ordre.}$$

Quatrième étape

On cherche à minimiser $G(x)$, avec

$$G(\hat{\alpha}_2) = \sum_{i=1}^m \left[\left(P_{th_i}(\hat{\alpha}_2) - \frac{n_i}{N} \right)^2 / P_{th_i}(\hat{\alpha}_2) \right]$$

$$= A(\hat{\alpha}_1) + \varepsilon B(\hat{\alpha}_1), \text{ au premier ordre.}$$

$$\text{On en déduit: } \hat{\alpha}_2 = \hat{\alpha}_1 - \frac{A(\hat{\alpha}_1)}{B(\hat{\alpha}_1)}$$

Avec:

$$A(\hat{\alpha}_1) = G(\hat{\alpha}_1)$$

$$B(\hat{\alpha}_1) = \frac{\partial G}{\partial \alpha}(\hat{\alpha}_1) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial P_{th_i}}{\partial \alpha}(\hat{\alpha}_1) \times \left[2 \frac{\left[P_{th_i}(\hat{\alpha}_1) - \frac{n_i}{N} \right]}{P_{th_i}(\hat{\alpha}_1)} - \frac{\left[P_{th_i}(\hat{\alpha}_1) - \frac{n_i}{N} \right]^2}{P_{th_i}(\hat{\alpha}_1)^2} \right]$$

$$\text{et } P_{th_i}(\alpha) = \left(\frac{A_o}{A_{i-1}} \right)^\alpha - \left(\frac{A_o}{A_i} \right)^\alpha$$

$$\text{et } \frac{\partial P_{th_i}}{\partial \alpha}(\alpha) = \ln \frac{A_o}{A_{i-1}} \times \left(\frac{A_o}{A_{i-1}} \right)^\alpha - \ln \frac{A_o}{A_i} \times \left(\frac{A_o}{A_i} \right)^\alpha$$

On réitère éventuellement le procédé en substituant α_2 à α_1 et ainsi de suite.

Cet algorithme a des chances de converger sous l'hypothèse d'une adéquation parfaite à une loi de Pareto de paramètre α_c .

En effet:

$$G(\alpha_c) = 0$$

$$G'(\alpha_c) = 0$$

$$G''(\alpha_c) = 2 \sum_{i=1}^m \left[\frac{\partial P_{th_i}}{\alpha_c}(\alpha_c) \right]^2 x \frac{1}{P_{th}(\alpha_c)} > 0$$

$$\alpha_{n+1} = \alpha_n - \frac{G(\alpha_n)}{G'(\alpha_n)} = \alpha_n - \frac{(\alpha_n - \alpha_c)^2}{2} \frac{[G''(\alpha_c) + o_1(\alpha_n - \alpha_c)]}{(\alpha_n - \alpha_c) [G''(\alpha_c) + o_2(\alpha_n - \alpha_c)]}$$

avec $o_1(x) \rightarrow 0$ et $o_2(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$

Nous avons donc:

$$\alpha_{n+1} - \alpha_c = (\alpha_n - \alpha_c) \left[1 - \frac{1}{2} + o_3(\alpha_n - \alpha_c) \right] \text{ avec } o_3(x) \rightarrow 0 \text{ lorsque } x \rightarrow 0.$$

Puisque $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, dans un voisinage de α_c , $|\alpha_{n+1} - \alpha_c| < \frac{3}{4} |\alpha_n - \alpha_c|$ on

en déduit que $\alpha_n \rightarrow \alpha_c$, lorsque $n \rightarrow +\infty$, si α_1 est suffisamment proche de α_c .

Application numérique

Elle se fera sur le portefeuille Incendie (Risque Simple) d'une compagnie d'assurance allemande. On ne considérera ici que les risques supérieurs à $c = 5$, l'unité monétaire étant ici occultée.

Tranche	Nombre de risques
1 - 5	2.520
5 - 10	700
10 - 20	514
20 - 50	517
50 - 100	284
100 - 200	200
200 - 500	203
500 - 1.000	115
> 1.000	289
Σ	5.342

Nombre d'itérations	$\hat{\alpha}$
1	0,415
2	0,392
3	0,410
4	0,350
5	0,380
6	0,399
7	0,421
8	0,403
9	0,441
10	0,420
11	0,401
12	0,429

Observons par ailleurs $G(\alpha) N$.

$$\begin{aligned}
 G(0,38) N &= 30,16 & G(0,40) N &= 10,07 & G(0,42) N &= 13,21 \\
 G(0,39) N &= 17,15 & G(0,41) N &= 8,79 & G(0,405) N &= 8,71 \\
 & & & & G(0,415) N &= 10,29
 \end{aligned}$$

Si l'on teste l'hypothèse d'adéquation de la distribution des capitaux assurés à une distribution de Pareto de paramètre $\alpha = 0,405$ par la loi du Khi-deux, nous avons $\kappa_{(9-1-1)}^2(U) = \kappa_7^2(U) = 95\%$ implique $U = 14,1$

Or $8,71 < 14,1$; on peut donc accepter l'hypothèse paretienne avec un seuil de tolérance de 5%. Cette méthode du Khi-deux minimum nous donne même le seuil critique, si on le souhaite.

ANNEXE 2

Il n'est pas toujours évident de trouver un portefeuille, comme celui qu'on vient de décrire, qui se prête à un ajustement des capitaux assurés sur une distribution de Pareto.

La question, ici, est de savoir pourquoi ces lois sont souvent prises en référence.

On part d'un principe bien simple: l'espérance du nombre de sinistres à charge doit être proportionnelle au nombre de risques exposés.

Les lois de Pareto (malgré la réserve importante qu'on a émise précédemment) sont solution.

On a vu, en effet, que $-\frac{L'(x)}{L(x)} = -\frac{N'_x}{N_x} = \frac{\alpha}{x}$ soit encore $L(x) = k N_x$.

Montrons que ce sont les seules solutions de ce problème, pour toute loi $T(t)$.

On a $L(x) = d N_x$ soit $\frac{L'(x)}{L(x)} = \frac{N'_x}{N_x}$

$$\begin{aligned} \text{Comme } L(x) &= \int_x^{+\infty} -\frac{dN_u}{d_u} \left[1 - T\left(\frac{x}{u}\right) \right] d_u \\ &= \int_x^{+\infty} N_u \frac{x}{u^2} t\left(\frac{x}{u}\right) du \\ L'(x) &= \int_x^{+\infty} \frac{dN_u}{d_u} x \frac{1}{u} t\left(\frac{x}{u}\right) du, \end{aligned}$$

nous avons

$$0 = L'(x) - L(x) \frac{N'_x}{N_x} = \int_x^{+\infty} t\left(\frac{x}{u}\right) x \frac{1}{u} \left[N'_u - \frac{x}{u} N_u \frac{N'_x}{N_x} \right] du$$

Cette égalité est vraie pour toute fonction t .

$$\text{Nous avons donc } \frac{N'_u}{N_u} = \frac{x}{u} \frac{N'_x}{N_x} = \frac{k}{u}$$

N_u suit donc bien une distribution de Pareto de paramètre $-k$.

REMERCIEMENT

Je remercie les deux correcteurs anonymes, grâce auxquels j'ai pu procéder à des rectifications d'importance. Mille et un remerciements à MARTINE MANAUD.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] ERWIN STRAUB (1971) Estimation of the number of Excess Claims by means of the Credibility theory. *ASTIN Bulletin* V.
- [2] METTE RYTGAARD (1989) Estimation of the Pareto Distribution, (XXI^e Colloque Astin à New-York).

CLAUDE HUYGHUES-BEAUFOND

Assurances Générales de France, 8-10 rue Villedo, F-75001 Paris.