DESIGNA FARMACENTICA. Comprision reactivertes con pelicuta. Comprisidos reactivertes con pelicuta. Comprisidos de color amento de superioris. FORMA FARMACENTICA. Comprisidos reactivas con pelicuta. Comprimidos reactivas de consistentes de superioris. Fisadorio Deseavo. Mayor instanto obsessos Compulsivo. Instanto de Arquesta con y en agrandada. Instanto de Comprisido de Securiorio de Securiorio de Securiorio Deseavo. Instanto de Arquesta con y en agrandada. Instanto de Arquesta con y en agrandada. Instanto de Arquesta con y en agrandada. Instanto de Arquesta con y en agrandada en activa de la comprisión de Comp processes, post-security information and increases of the security information and contained by passes on instances and increase of the security information and increases of the security of adetados por la inducción o inhibición de enzimas metabolizantes del farmaco. Cuando se administra parovetiria conjuntamente con un tarmaco inhibidión del m No se consideran necesanos ajustes iniciales de la dosis cuando se administra parovetiria conjuntamente con un tarmaco inhibidión del m No se consideran necesanos ajustes iniciales de la dosis cuando se administración deria de parovetira conjuntamente con un tarmaco inhibidión del m No se consideran necesanos ajustes iniciales de la dosis cuando se administración deria de parovetira conjuntamente con terral de la considera de parovetira experimenta con carbamacognia, fertitorira, valoridados confiderados conjuntamente que se metabolizan por dicto enzima. Especial de sercitorios de la recapitación de sercitoria de conducir a un aumento de las concerteaciones plasmidicas de aquellos farmacos administratos conjuntamente que se metabolizan por dicto enzima. Esposino (ej. perferazina y fundazina, ver alpertado Contra indicaciones), risperidoria, ciertos antiemtrinicos. Tipo de juntazina, ver alpertado Contra indicacionesi, risperidoria, ciertos antiemtrinicos. Tipo de juntazina, ver alpertado Contra indicacionesi, risperidoria, ciertos antiemtrinicos. Tipo de juntazina, ver alpertado Contra indicacionesi, risperidoria, ciertos antiemtrinicos. Tipo de juntazina, ver alpertado contratinados con antiemperidorio de metoprorio para esta indicación. Adonto, Como con otros, ármacos pisodropos, se debe recomendar al paparecer interacción farmacodinámica entre percuentra y los anticoaquiantes orales. He uso concomitante de parovetira con anticoaquiantes orales, de major de la suso concomitante de parovetira con anticoaquiantes orales, de major de la concomitante de parovetira con anticoaquiantes orales, de major de la concomitante de parovetira con anticoaquiantes orales, farmacos qualtes es conce que afector de parovetira o aumentira el desponde de la concomitante de la concom inación con metoprolo cuando se administre a pacientes con insuficiencia alcohol mientras esté tomando paroxetina. Anticoagulantes orales. Puede l anticoagulante y del niesgo de hemorragia. Por tanto, paroxetina debe ser os. Puede aparecer interacción farmacodinámica entre parovetina o pacientes que toman inhibidores selectivos de la recaptación de o clozapina, fenotiazinas, la mayoria de antidepresivos triciclicos, Embarazo. Los datos obtenidos en ur o este estrictamente, noicado. Las mujeres que deser ada observados tras la discontinuación de paroxetina idios de madres expuestas a paroxetina en las ultimas tonia, hiperreflexia, temblores perviossmo, intabilidad as el partir o puod tien po después de eclínicos sobre segundad). Lactancia ectaron signos del efecto del farmaco ricia clínica muestra que el tratamiento y para manipular maquinaria, Aunque Attacks de la che multimas, se exception pour less particulos de prometina. En estudos plusados, les conformacións de la characteristic de la characteristic

https://doi.org/10.1017/S1134066500005099 Published online by Cambridge University Press

## SOLICITUD DE RECEPCIÓN

## European Psychiatry

(EDICIÓN ESPAÑOLA)

Nombre
Apellidos
Domicilio
Población C.P.
D.N.I. o N.I.F.
Especialidad
N.º de Colegiado
Centro de Trabajo
Servicio
Si desea recibir periódicamente la edición española de EUROPEAN PSYCHIATRY, cumplimente los datos requeridos y envíelos a SANED, SL. Capitán Haya, 60. 28020 Madrid. Fax: 91 749 95 07 E-mail: saned@medynet.com

Los datos recogidos en este formulario serán tratados e incorporados a un fichero electrónico propiedad de MEDICINA Y TEXTOS MEDITEX S.L., con el objetivo de utilizarlo para comunicar novedades respecto al servicio, informaciones de carácter científico, formativo, comercial y publicitario en el área de salud, así como otros servicios considerados de interés para el usuario, e informaciones de los patrocinadores del servicio. Este fichero será transmitido a las compañías del grupo y utilizado por ellas para los mismos fines indicados anteriormente. Firmando o enviando electrónicamente el presente documento, usted dará su consentimiento explícito e inequívoco para que sus datos sean incluidos en el presente fichero, de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a MEDITEX, S.L. C/ Capitán Haya, 60, 1º. 28020 Madrid.






## Una herramienta para acceder cómodamente a la información

Laboratorios Servier, siempre a la vanguardia en I+D+I, vuelve a ser pionero en el campo de las neurociencias y la psiquiatría, presentando innovaciones en el área de la salud mental.

Para conocerlas sólo tiene que acceder a www.vxdepresion.com







Un auténtico instituto virtual, que le ofrece de una manera rigurosa y profesional toda la información acerca de esta innovación, incluyendo estudios científicos, resultados de ensayos clínicos, literatura médica o todo lo que necesite saber al respecto. Si además quiere obtener una serie de ventajas exclusivas, le invitamos a conocer el VX Club.









## El antidepresivo da lo necesario





