

notre connaissance aucune étude portant sur le fonctionnement psychique de ces patients.

**Objectif** Nous avons souhaité explorer le lien entre les maltraitements infantiles d'une part, et la symptomatologie, la cognition et le fonctionnement psychique et identitaire d'autre part, dans la schizophrénie.

**Méthodologie** Une étude exploratoire a été menée sur sept patients stabilisés, souffrant de schizophrénie (selon les critères du DSM-IV-TR) et présentant des hallucinations auditivo-verbales. Pour chaque patient, la symptomatologie clinique était évaluée par les échelles d'hétéro-évaluation suivantes : Positive and Negative Syndrome Scale, Échelle d'Évaluation des Hallucinations Auditives. La maltraitance infantile était évaluée quantitativement par le Childhood Trauma Questionnaire. Le fonctionnement psychique et identitaire des patients était observé au moyen du Rorschach en Système Intégré, administré lors d'un second rendez-vous.

**Discussion** La maltraitance infantile apparaît être corrélée à la symptomatologie de la schizophrénie ainsi qu'à la cognition et au fonctionnement psychique des patients. En effet, nous observons des corrélations fortes : entre la durée des hallucinations et les négligences, entre les abus physiques et les troubles de la pensée, ainsi qu'entre la représentation de soi et les abus sexuels et émotionnels. La présente étude offre des perspectives thérapeutiques intéressantes et nécessiterait d'être reproduite sur une plus large population.

**Mots clés** Traumatisme ; Maltraitance infantile ; Schizophrénie ; Rorschach

**Déclaration d'intérêts** Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

#### Références

- [1] Read J, Van Os J, Morrison AP, Ross CA. Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. *Acta Psychiatr Scand* 2005;112:330–50.
- [2] Bendall S, Jackson HJ, Hulbert CA, McGorry PD. Childhood trauma and psychosis disorders: a systematic, critical review of the evidence. *Schizophr Bull* 2008;34(3):568–79.
- [3] Üçok A, Bikmaz S. The effects of childhood trauma in patients with first-episode schizophrenia. *Acta Psychiatr Scand* 2007;116:371–7.
- [4] Gil A, Gama CS, Rocha de Jesus D, Lobato MI, Zimmer M, Belmonte-de-Abreu P. The association of child abuse and neglect with adult disability in schizophrenia and the prominent role of physical neglect. *Child Abuse Negl* 2009;33:618–24.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.200>

#### P070

### Les tentatives de suicide chez les jeunes âgés de 11 à 18 ans, dans les services d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire de la Martinique

D. Carmelo<sup>1,\*</sup>, S. Lamy<sup>1,2</sup>, A. Charles-Nicolas<sup>1</sup>, N. Pascal<sup>3</sup>, L. Jehel<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> CHU de Martinique, Fort-de-France, Martinique, France

<sup>2</sup> Inserm U 669 IPOM, Fort-de-France, Martinique, France

<sup>3</sup> EPDSM Pédiopsychiatrie, Fort-de-France, Martinique, France

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [mulderdan@hotmail.com](mailto:mulderdan@hotmail.com) (D. Carmelo)

**Introduction** La suicidalité à l'adolescence est une question importante de santé publique, en termes de mortalité, de morbidité. Celle-ci est peu évaluée et quantifiée dans les en Martinique au sujet des adolescents. Notre objectif à travers de notre étude prospective exploratoire est de déterminer de la prévalence des tentatives de suicide chez les adolescents en Martinique consultant au CHUM.

**Méthodes** Nous avons inclus tous les adolescents âgés de 11 à 18 ans ayant réalisé une tentative de suicide en Martinique, admis

sur les différents services d'urgences et de réanimations du CHUM, sur une période continue de 4 mois.

**Résultats** Quarante-trois tentatives de suicide ont été enregistrées au cours de cette période : 88,4% des cas impliquaient des filles (avec une récurrence sur la période d'inclusion), 58,1% des jeunes ont utilisé comme méthode l'intoxication médicamenteuse volontaire, la majorité concernait des primo-suicidants (60,5%), près de la moitié des cas avait identifié un événement traumatisant, 34,9% ont déclaré consommer de façon régulière une substance psychoactive enfin 72,5% des situations ont fait intervenir le SAMU et 65,2% de ces adolescents ont bénéficié d'une prise en charge hospitalière.

**Conclusion** Cette étude pilote permet de contribuer à la description de la tentative de suicide chez les adolescents, qui s'estimerait à 1 tentative de suicide tous les 3 jours, et confirme bien une problématique suicidaire touchant cette population spécifique dans ce département. Elle suggère par ailleurs la nécessité de renforcer l'offre de soins qui semble insuffisante à ce jour. Au vu des résultats de cette étude, l'implication forte du SAMU dans ce travail pourrait être un partenaire idéal dans le repérage de ces conduites suicidaires dans cette région.

**Mots clés** Tentative de suicide ; Adolescent ; DOM

**Déclaration d'intérêts** Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

#### Pour en savoir plus

Vedrinne J, Weber D. Les étapes de la crise suicidaire ; Fédération française de psychiatrie. La crise suicidaire : reconnaître et prise en charge ; 2000:9–20.

Adès J, Lejoyeux M. Conduites de risque. EMC Psychiatrie 2004;1(3):201–215.

Merle S. Observatoire régional de la santé en Martinique – Dépressivité et tentatives de suicide chez les jeunes en Martinique – Enquête ETADAM; 2011.

Jeammet P, Birot E. Étude psychopathologique des tentatives de suicide chez l'adolescent et le jeune adulte. PUF Éd.; 1994.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.201>

#### P071

### La mémoire autobiographique chez l'enfant avec Trouble du Spectre Autistique : du passé au futur

J. Le Vaillant<sup>1,\*</sup>, M. Anger<sup>2</sup>, C. Barthelemy<sup>3</sup>, F. Bonnet-Brilhault<sup>3</sup>, J. Malvy<sup>3</sup>, F. Eustache<sup>4</sup>, B. Guillery-Girard<sup>4</sup>, J.-M. Baleyte<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Centre Ressources Autisme, CHU de Caen et Unité Inserm U1077 Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, Caen, France

<sup>2</sup> Service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, CHU de Caen et Unité Inserm U1077 Neuropsychologie et neuro-anatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, Caen, France

<sup>3</sup> Centre Ressources Autisme, CHU de Tours et Unité Inserm U930 Imagerie et Cerveau « Autisme », Tours, France

<sup>4</sup> Unité Inserm U1077 Neuropsychologie et neuro-anatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, Caen, France

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [justine.levaillant@yahoo.com](mailto:justine.levaillant@yahoo.com) (J. Le Vaillant)

**Objectifs** L'étude de la mémoire autobiographique dans l'autisme a été principalement réalisée chez l'adulte [1] et plus rarement chez l'enfant, révélant principalement des déficits en mémoire épisodique [2]. Il n'existe qu'une étude chez l'adolescent [3] cherchant à caractériser les souvenirs épisodiques, incluant notamment leurs propriétés sensorielles. L'objectif de notre étude est d'évaluer les productions épisodiques d'événements à la fois passés et futurs, chez des adolescents avec trouble du spectre autistique, en utilisant un support et en explorant les détails phénoménologiques, émotionnels et les capacités de récollection.

**Matériel et méthodes** Un échantillon de 16 adolescents avec un diagnostic de trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle (TSA-SDI), et un groupe de 16 enfants au développement typique, ont réalisé une tâche de mémoire autobiographique