

The Single Journal Designed for the
General Hospital Psychiatrist

General Hospital Psychiatry

PSYCHIATRY, MEDICINE AND
PRIMARY CARE


Editor in Chief: Don R. Lipsitt

General Hospital Psychiatry is directed towards those members of the health care team who find themselves at the demanding junction of psychiatry, medicine, and primary care: psychiatrists, general and family practitioners, internists, nurses, pharmacologists, psychologists, and health care paraprofessionals.

General Hospital Psychiatry publishes original research covering such areas as consultation-liaison psychiatry, neuropsychiatry, pharmacopsychiatry, geropsychiatry, alcohol and substance abuse, law and ethics, the relationship of psychiatric services to general medical

systems, and new directions in medical education that stress psychiatry's role in primary care and family practice. Emphasizing a biopsychosocial approach to illness and health, this leading bimonthly is a critical resource for professionals in in-patient, ambulatory, and community settings. In addition to original articles the journal also features Brief Communications, News and Notes, Book Reviews, and Liaison Rounds.

Abstracted/Indexed in:
Biological Abstracts, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Current Contents, Excerpta Medica, Index Medicus, and Psychological Abstracts.



General Hospital Psychiatry	
PSYCHIATRY, MEDICINE AND PRIMARY CARE	
CONTENTS	
Volume 17, Number 5, September 1995	
The Array of Psychiatric Services in General Hospitals Mark Olson	277
The Impact of a Meditation-Based Stress Reduction Program on Hypertension Kenneth H. Kaplan, David L. Ginkleyberg, and Massimo Galati-Nickola	284
PSYCHIATRY AND PRIMARY CARE	
A Model Integrating Mental Health and Primary Care Services for Families with HIV Sharon Tompall and William K. Northrup	290
Inpatient Suicide in a General Hospital Psychiatric Unit: A Consequence of Inadequate Resources? David Rosen and George Tansino	301
EMERGENCY PSYCHIATRY IN THE GENERAL HOSPITAL	
Crises Hospitalization on a Psychiatric Emergency Service Richard C. Serlin, Richard J. Schrago, and Robert J. Erickson	307
Dimensions and Predictors of Change During Brief Psychiatric Hospitalization Paul B. Lehmann, Ellen B. McPherson, Rochelle Ellett, Elise Egertson, and Tarae Willett	314
Is There a Relationship Between Reticular Sympathetic Dysfunction and "Hypertension" Case Reports and a Hypothetical Scenarios for Hypertension and Other Targets? Albertine de Psychiatric Consultation Liaison Patients Irene Sauripis, Justin K. Sullivan, David J. Fennell, and Erika Alesia	325
Attitudes of Pediatricians Toward Psychiatric Consultation Karel J. Mihalovik and David G. Lerner	330
BRIEF REPORT	
EEG Emergent Agitation and Methohexital Succinylcholine Intoxication: Case Report Carolee M. Hovav	334
In Memoriam	342
Book Received	343
Announcements	344
Membership Information - American Association of General Hospital Psychiatrists	347

1995 Subscription Information
ISSN 0163-8343
Volume 17 (6 issues)

Personal Rate: \$142.00*
Institutional Rate: \$284.00
In-Training Rate: \$93.00†

Subscribers outside the U.S., please
add \$40.00 for postage and handling.

Note: All subscriptions begin with the first
issue of the calendar year. Subscription rates
valid through December 31, 1995

*Personal subscriptions must be paid with
personal check or charge card
†The In-Training Rate is valid for 2 years only

**Send all orders to the New York address.
Send sample copy requests to:**

in North America
Elsevier Science Inc.
PO Box 882
New York NY 10159

outside North America
Elsevier Science B.V.
PO Box 211, 1000 AE Amsterdam
The Netherlands

*For faster service, call or fax today to place
your order:*

Tel. No.: (212) 633-3950
Fax No.: (212) 633-3990

ETATS DEPRESSIFS
ETATS ANXIO-DEPRESSIFS



30 comprimés enrobés

STABLON 12,5 mg
Tianeptine

STABLON

12,5 mg

Tianeptine

Composition - présentation : Boîte de 30 comprimés enrobés, dosés à 12,5 mg de tianeptine (sel de sodium). **Propriétés :** Antidépresseur. *Chez l'animal*, la tianeptine augmente l'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hippocampe et en accélère la récupération. *Chez l'homme*, Stablon se caractérise par une activité : - sur les troubles de l'humeur ; - sur les plaintes somatiques liées à l'anxiété et aux troubles de l'humeur ; - sur les troubles du comportement de l'éthylique en période de sevrage. Stablon est dépourvu d'effet : - sur le sommeil et la vigilance ; - sur le système cardiovasculaire ; - sur le système cholinergique (absence de manifestation anticholinergique). **Indications thérapeutiques :** - États dépressifs névrotiques et réactionnels, - états anxio-dépressifs avec plaintes somatiques en particulier digestives, - états anxio-dépressifs observés chez l'alcoolique en période de sevrage. **Contre-indications :** Enfants de moins de 15 ans, IMAO, grossesse, allaitement. **Précautions d'emploi :** Par principe, surveillance attentive en début de traitement (risque suicidaire inhérent aux états dépressifs), précaution en cas d'anesthésie, information des conducteurs de machine d'un risque potentiel (cf. VIDAL), réduction progressive de la posologie à l'arrêt du traitement. **Interactions médicamenteuses :** IMAO. **Effets indésirables :** Rares, généralement bénins : - gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences, - insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie, - tachycardie, extrasystoles, précordialgies, - vertiges, céphalées, lipothymies, tremblements, bouffées de chaleur, - gêne respiratoire, boule dans la gorge, - myalgies, lombalgies. **Posologie et mode d'administration :** 3 comprimés par jour, matin, midi et soir. Chez l'alcoolique, cirrhotique ou non, aucune modification posologique n'est nécessaire. Chez les sujets de plus de 70 ans et en cas d'insuffisance rénale, 2 comprimés par jour. C.T.J. de 4,82 F à 7,23 F. Liste I. AMM : 329.339.1. Prix : 72,30 F. Remb. Séc. Soc. 65%. Collect. Laboratoire ARDIX, 25, rue Eugène-Vignat, 45007 Orléans. Pour plus d'informations se reporter au Vidal.