

SOLIAN[®] 50^{mg} amisulpride



ANTIDÉFICITAIRE RAPIDE ET MANIABLE

PROPRIÉTÉS : Neuroleptique caractérisé par sa rapidité d'action, antiproductif ou antidéficitaire selon la dose utilisée - **SORT DU MÉDICAMENT** : Se reporter au Vidal - **INDICATIONS** : Traitement des psychoses - États déficitaires des schizophrénies, des évolutions psychotiques résiduelles, des états d'inhibition avec ralentissement - **POSOLOGIE** : La forme Solian 50 mg est particulièrement adaptée au traitement des états déficitaires et états d'inhibition : 1 à 5 comprimés par jour (coût j.t. : 2,31 à 11,55 F). Le traitement des psychoses productives se fera plutôt à l'aide de Solian 200 mg ou de Solian injectable - **MISE EN GARDE** : Suspendre le traitement en cas d'hyperthermie, surtout s'il est utilisé à forte dose, cette hyperthermie peut être l'un des éléments du syndrome malin des neuroleptiques - **EFFETS INDÉSIRABLES** : Sédation ou somnolence (à forte dose), dyskinésies précoces (torticolis spasmodique, crises oculogyres, trismus) cédant à un antiparkinsonien anticholinergique, syndrome extrapyramidal cédant partiellement aux antiparkinsoniens anticholinergiques, dyskinésies tardives qui pourraient être observées comme avec tous les neuroleptiques au cours de cures prolongées, hypotension modérée (à forte dose), impuissance, frigidity, aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, hyperprolactinémie, prise de poids - **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : Déconseiller l'absorption d'alcool pendant le traitement. Réduire la posologie et prescrire des cures discontinues chez l'insuffisant rénal grave. Renforcer la surveillance chez les épileptiques et les sujets suspects d'être porteurs d'un phéochromocytome. Prudence chez le sujet âgé, le parkinsonien, la femme enceinte (par prudence, ne pas utiliser au cours du premier trimestre de grossesse) - **VIGILANCE ET CONDUITE** : Risque de somnolence - **INTERACTIONS** : Potentialisation possible des hypotenseurs, des antihypertenseurs et des déprimeurs du système nerveux central. Association à la lévodopa déconseillée - **SURDOSAGE** : Syndrome parkinsonien gravissime, coma, traitement symptomatique - **PRÉSENTATIONS** : Comprimés dosés à 50 mg d'amisulpride - boîte de 30 - A.M.M. 328 445.2 - **TABLEAU A - PRIX PUBLIC** : Comprimés à 50 mg, 69,30 F + S.H.P. - Remboursé par la Sécurité Sociale à 70 %. Agréé aux collectivités.



Xanax

Alprazolam

Régulateur de la surcharge anxieuse

Propriétés : Benzodiazépine anxiolytique à demi-vie intermédiaire (12 à 15 heures environ), métabolisée au niveau hépatique, éliminée par voie rénale. Indications : Anxiété sous toutes ses formes. Contre-indications : Allergie connue aux benzodiazépines, insuffisance respiratoire en raison de l'effet dépresseur des benzodiazépines. L'aggravation de l'hypoxie peut elle-même entraîner une anxiété justifiant alors une prise en charge du patient en soins intensifs. Mise en garde : Le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement. Un syndrome de sevrage peut intervenir à l'arrêt brutal d'un traitement prolongé, surtout à doses élevées, mais également à doses usuelles; il est recommandé par prudence de réduire progressivement les doses. La tolérance et l'efficacité de Xanax n'ont pas été étudiées chez les sujets de moins de 18 ans. Précautions d'emploi : • Grossesse : ne pas utiliser au cours du premier trimestre; éviter les doses élevées lors du dernier trimestre • Allaitement : ne pas utiliser pendant la lactation • Myasthénie : surveillance accrue • Dépression : les benzodiazépines utilisées seules ne constituent pas un traitement de la dépression • Absorption de boissons alcoolisées formellement déconseillée • L'attention est attirée chez les conducteurs de véhicules et utilisateurs de machines (risques de somnolence diurne) • Insuffisance rénale et/ou hépatique : adapter la posologie • Sujet âgé : il est recommandé de diminuer la posologie (la moitié de la posologie moyenne peut être suffisante). Interactions : • Alcool : majoration de l'effet sédatif des benzodiazépines. Augmentation du risque en cas de conduite automobile ou d'utilisation

de machines • Cimétidine : risque accru de somnolence • Autres déprimeurs du système nerveux central : majoration de la dépression centrale. Effets indésirables : En rapport avec la dose et la sensibilité individuelle du patient, somnolence (en particulier sujet âgé), hypotonie musculaire, amnésie antérograde, sensations ébrieuses, chez certains sujets, réactions paradoxales (à type d'excitation), éruptions cutanées prurigineuses. A l'arrêt brutal du traitement, possibilité d'un syndrome de sevrage avec incidents mineurs : irritabilité, anxiété, myalgie, tremblements, rebond d'insomnie, nausées et vomissements... et exceptionnellement, incidents majeurs (convulsions isolées - état de mal myoclonique). Posologie : le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement. Initiation du traitement par 0,25 mg le matin, 0,25 mg le midi et 0,50 mg le soir (0,25 mg chez le sujet âgé) puis ajuster individuellement la posologie de façon progressive en fonction de la réponse thérapeutique et de la tolérance. La posologie moyenne est de 1 à 2 mg par jour, la dose quotidienne maximale est de 4 mg. Coût du traitement journalier : 1,81 à 3,13 F. Surdosage : Pas d'antidote - traitement symptomatique en milieu spécialisé. Présentation : 0,25 mg : boîte de 30 comprimés sécables blancs. Tableau A - A.M.M. 326.444.9. Prix : 13,60 F + S.H.P.A. 0,50 mg : boîte de 30 comprimés sécables de couleur rose. Tableau A - A.M.M. 326.445.5. Prix : 23,50 F + S.H.P.A. Remboursé Sécurité Sociale 70 % - Collectivités, Laboratoires UPJOHN - Tour Franklin - Cedex 11 - 92081 PARIS-LA DEFENSE - Tél. 47.76.41.44. Pour une information complète, consulter le dictionnaire Vidal

