

ELSEVIER LIFE SCIENCES



PHARMACOLOGY



NEUROSCIENCE




ENDOCRINOLOGY



IMMUNOLOGY



CELL



CLINICAL MEDICINE



VIROLOGY



Psychiatry

Focus on

Psychiatry is an area of worldwide, intensive research. Published from offices in Amsterdam, New York, Cambridge and Paris, Elsevier's journals and books are uniquely positioned to cover and synthesise the latest and most significant advances.

Journals:

Journal of Affective Disorders
General Hospital Psychiatry
Neuropsychopharmacology

Psychiatry Research
European Psychiatry
Schizophrenia Research
Drug and Alcohol Dependence

Psychiatry Research- Neuroimaging Section
Biological Psychiatry
European Neuropsychopharmacology
Trends in Neuroscience

Books and Book Series:

Handbook of Studies on Child Psychiatry - B.J. Tonge et al.
Handbook of Studies on General Hospital Psychiatry - F.K. Judd et al.

Handbook of Anxiety series
Handbook of Neuropsychology series

For further information on these books/series or sample copies of any of the journals, please contact:

Elsevier Science Publishers

P.O. Box 1527
1000 BM Amsterdam
The Netherlands
Fax (20) 5803 342

Journal Information Center
Elsevier Science Publishing Co. Inc.
P.O. Box 882, Madison Square Station
New York, NY 10159, U.S.A.
Tel. (212) 633 3750



PRAZINIL

CARPIPRAMI

4 comprimés par jour
en 2 prises matin et soir



Forme et présentation : Etui de 24 comprimés sécables dosés à 50 mg de carpipramine (DCI) base sous forme de dichlorhydrate monohydrate. **Propriétés :** Psychotrope désinhibiteur. **Indications :** • Inhibition au cours des états anxieux. • Les psychoses schizoéphréniques à symptomatologie délicate, qu'il s'agisse de psychoses déficitaires d'emblée (forme hébéphréniques, schizophrénies simples) ou de déficit progressif survenant au cours de l'évolution des psychoses chroniques. **Contre-indications :** • Troubles de la conduction et du rythme cardiaque. • Ne pas associer aux IMAO ; respecter un délai de 15 jours après l'arrêt d'un traitement comportant ce type de médicament. • Affections hépatiques et rénales sévères. • Grossesse - chez une espèce animale, l'expérimentation met en évidence à très forte dose un embryon et une foetotoxicité. Dans l'espèce humaine, le risque n'est pas connu ; par conséquent, par mesure de prudence, éviter de prescrire pendant la grossesse. • L'allaitement est déconseillé pendant le traitement. **Précautions d'emploi :** • Surveillance en début de traitement (psychique et somatique) notamment chez les patients avec risque suicidaire. • Surveillance renforcée chez les épileptiques. • Surveillance particulière en cas d'anesthésie générale. • A utiliser avec précautions en cas d'affection cardio-vasculaire grave, d'insuffisance rénale et/ou hépatique. **Interactions médicamenteuses :** Association déconseillée avec l'alcool. **Associations à prendre en compte :** • Antihypertenseurs : majoration de l'effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorée. • Autres déprimeurs du système nerveux central : majoration de la dépressivité pouvant avoir des conséquences importantes, notamment en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines. **Effets indésirables :** • Quelques cas de difficultés d'endormissement ont été rapportés. • Possibilité d'hypotension (en particulier chez le sujet âgé). • Très rares cas de galactorrhée et d'aménorrhée. **Mode d'emploi et posologie :** • 1 à 4 comprimés par jour, la posologie moyenne étant de 3 comprimés par jour en 2 ou 3 prises. • L'activité du Prazinil se répercute généralement entre le 7^e et le 15^e jour. **Surdosage :** En cas de surdosage massif : procéder à l'évacuation rapide du produit ingéré, hospitaliser le patient en milieu hospitalier. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Liste I. A.M.M. 320 437.0 (1976). PRAZINIL (24 comprimés) Remboursé Sécurité Sociale à 70 %. Admis aux Collectivités. Laboratoires Pierre Fabre - PIERRE FABRE MEDICAMENT - 45, place Abel Gance - 92100 Boulogne.