



# EDITIONS SCIENTIFIQUES ELSEVIER

---

## BIO-SCIENCES

---

BIOCHIMIE

BIOFUTUR

LE MENSUEL EUROPÉEN DES BIOTECHNOLOGIES

BIOLOGY OF THE CELL

EUROPEAN BIOTECHNOLOGY NEWSLETTER

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

FLASH ÉTATS-UNIS

FLASH JAPON

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT PASTEUR :

RESEARCH IN IMMUNOLOGY

RESEARCH IN MICROBIOLOGY

RESEARCH IN VIROLOGY

BULLETIN DE L'INSTITUT PASTEUR

---

## CHIMIE

---

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE :

JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE ET DE PHYSICO-  
CHIMIE BIOLOGIQUE

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE ET  
DE LA SOCIÉTÉ DE CHIMIE INDUSTRIELLE :

ANALYSIS

LE JOURNAL DE LA PHYSICO-CHIMIE ET DE L'ANALYSE INDUSTRIELLE

---

## BIO-MÉDICAL

---

ANNALES DE RÉADAPTATION ET DE MÉDECINE  
PHYSIQUE

BIOMÉDECINE & PHARMACOTHERAPY

BULLETIN DU CANCER

BULLETIN DU CANCER/RADIOTHÉRAPIE

IMMUNOANALYSE & BIOLOGIE SPÉCIALISÉE

NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE

OPTION/BIO

LE JOURNAL DE L'ANALYSE MÉDICALE ET DE LA BIOLOGIE CLINIQUE

PÉDIATRIE

PSYCHIATRIE & PSYCHOBIOLOGIE

SCIENCE & SPORTS

THE LANCET ÉDITION FRANÇAISE

URGENCES MÉDICALES

---

## AGRO-SCIENCES

---

PUBLICATIONS DE L'INRA :

AGRONOMIE

ANNALES DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES

ANNALES DES SCIENCES FORESTIÈRES

ANNALES DE ZOOTECHNIE

APIDOLOGIE

GENETICS, SELECTION, EVOLUTION

LE LAIT

RÉPRODUCTION, NUTRITION, DEVELOPMENT

Editions scientifiques ELSEVIER - 29 rue Buffon, 75005 PARIS.  
Tél. (1) 47.07.11.22 - Telex 202 400 F - Télécopie (1) 43.36.80.93.  
Pour toute information, abonnement et demande de spécimens.

ARBRA4-1

CURRENT AWARENESS  
ABSTRACTS FROM  
EXCERPTA MEDICA

# Drug Dependence, Alcohol Abuse and Alcoholism

- MORE CURRENT THAN ~~ANY OTHER~~
- MORE INTERNATIONAL THAN ~~ANY OTHER~~
- MORE ABSTRACTS THAN ~~ANY OTHER~~
- DEEPER INDEXED THAN ~~ANY OTHER~~

Section 40  
Volume 17  
(1 volume in 6 issues)  
Price: Dfl. 702.00

**GET YOUR FREE  
SPECIMEN COPY NOW!**

Send your request to:  
EXCERPTA MEDICA  
ELSEVIER SCIENCE  
PUBLISHERS  
Attn: JAN JANSMA  
P.O. Box 1527  
1000 BM AMSTERDAM  
The Netherlands

Distributor in the U.S.A. and  
Canada:

Journal Information Center  
ELSEVIER SCIENCE  
PUBLISHERS  
655 Avenue of the Americas  
New York, N.Y. 10010

Yes, please send me a free specimen copy  
of Section 40

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_


Post Code: \_\_\_\_\_

Country : \_\_\_\_\_

# PERSONNALISER LE TRAITEMENT DE L'ANXIÉTÉ



**FORME ET PRÉSENTATION :** Flacon 20 ml. **COMPOSITION :** prazépam : 1,500 g, propylène-glycol, éthylidithylène-glycol, saccharine sodique, polysorbate 80, menthol, anéthole, bleu enté V, Q.S. pour 100 ml de solution. 1 ml de cette solution correspond à 30 gouttes contenant 15 mg de prazépam. **SORT DU MÉDICAMENT :** Cf. Vidal. **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES :** Benzodiazépine : anxiolytique, sédatif, anticonvulsivant, myorelaxant. **INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Anxiété sous toutes ses formes. Troubles fonctionnels et manifestations somatiques associés à l'anxiété. **CONTRE-INDICATIONS :** Allergie connue aux benzodiazépines. Insuffisance respiratoire. **MISE EN GARDE :** Durée du traitement : le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement car peu d'études permettant d'apprécier le maintien de l'efficacité à long cours sont actuellement disponibles. Phénomène de sevrage : un syndrome de sevrage peut survenir à l'arrêt brutal d'un traitement prolongé, surtout à doses élevées. Dans de telles situations, il est recommandé, par prudence, de réduire progressivement les doses, ou en cas d'arrêt brutal, de surveiller très attentivement le malade. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Myasthénie - Dépression - Grossesse et allaitement : Cf. Vidal. L'absorption de boissons alcoolisées est formellement déconseillée pendant la durée du traitement. En cas d'insuffisance rénale et/ou d'insuffisance hépatique, il peut être nécessaire d'adapter la posologie. Attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament. **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :** Synergie additive : avec les déprimeurs centraux (curarisants, myorelaxants), avec d'autres médicaments déprimeurs centraux (en particulier certains neuroleptiques : la prise simultanée pourrait majorer la sédation). Le risque d'apparition de syndrome de sevrage est majoré par l'association de benzodiazépines prescrites comme anxiolytiques ou comme hypnotiques. **EFFETS INDÉSIRABLES :** Cf. Vidal. Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient : éruptions cutanées, sensations ébrieuses, somnolence, etc. **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :** Durée du traitement : Cf. Vidal. **Mise en garde :** Chez l'adulte : en pratique médicale courante 20 à 30 gouttes soit 10 à 30 mg en plusieurs prises réparties au cours de la journée. C.t.j. : 0,59 à 1,6 F. Chez le sujet âgé : il est recommandé de diminuer la posologie, par exemple la moitié de la posologie moyenne peut être suffisante. **SURDOSAGE :** En cas de prise massive, les signes de surdosage se manifestent, principalement par un sommeil profond pouvant aller jusqu'au coma, selon la quantité ingérée. Tableau A. A.M.M. 331168.6 (1988). Mis sur le marché en France le 19.04.1988. Prix : 17,60 F + SHP (20 ml). Remb. Séc. Soc. à 70%. Collect. Pharm. D. 1988. **RKE-DAVIS, 11, Avenue Dubouche, 92407 COURBEVOIE Cedex, Tél. (1) 43.64.07.01**



## LYSANXIA Gouttes

prazépam

### LA FORME DE PRECISION


# PROZAC<sup>®</sup> 20mg

Chlorhydrate de Fluoxétine

## UN PROGRÈS MAJEUR DANS LE TRAITEMENT DES ÉTATS DÉPRESSIFS



**Gélules :** boîte de 14. **Composition :** gélules : chlorhydrate de fluoxétine correspondant à 20 mg de fluoxétine base. **Indications thérapeutiques :** états dépressifs. **Contre-indications :** association avec les IMAO - hypersensibilité connue à la fluoxétine - enfants de moins de 15 ans. **Mise en garde :** un délai de 14 jours doit être respecté entre l'arrêt de l'IMAO et le début du traitement par la fluoxétine. Un délai de cinq semaines doit être respecté entre l'arrêt de la fluoxétine et le début du traitement par un IMAO. **Précautions d'emploi :** le suicide constitue un risque inhérent à l'état dépressif. L'association de la fluoxétine avec une sismothérapie n'est pas recommandée. En cas de dysfonctionnement hépatique, une réduction de la posologie doit être envisagée. L'apparition de troubles respiratoires persistants peut demander une évaluation plus approfondie. Des cas d'hyponatrémie ont été rapportés, pour la plupart, chez des patients âgés, prenant des diurétiques ou encore hypovolémiques. L'innocuité durant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. Prévenir les conducteurs d'automobiles et les utilisateurs de machine d'une éventuelle modification de leur comportement. **Interactions médicamenteuses :** la fluoxétine peut allonger la demi-vie du diazépam. Une augmentation supérieure à deux fois des taux plasmatiques des autres anti-dépresseurs a pu être signalée lors de leur administration conjointe avec PROZAC 20 mg. **Effets indésirables :** peuvent être observés : nausées, diarrhée, bouche sèche, céphalées, nervosité, insomnie, anxiété, somnolence, tremblements et éruptions cutanées, rarement associées à une urticaire, des arthralgies, un syndrome du canal carpien, de la fièvre et/ou un dysfonctionnement hépatique. Éruptions et symptômes concomitants sont réversibles à l'arrêt du traitement. Des réactions maniaques ou psychotiques peuvent apparaître chez certains sujets prédisposés. La fluoxétine peut induire une perte de poids banale n'entraînant que très rarement l'arrêt du traitement. Exceptionnellement, on peut noter une élévation des transaminases sériques et/ou une leucopénie asymptomatique, réversibles à l'arrêt du traitement. Des saignements vaginaux ou des cas d'hyperprolactinémie ont été enregistrés. Des symptômes respiratoires tels une dyspnée persistante ou une augmentation de la toux ont été exceptionnellement rapportés (cf. précautions d'emploi). **Mode d'emploi et posologie :** la posologie recommandée est de 20 mg/jour. Cette posologie peut être augmentée jusqu'à 60 mg/jour. Elle doit être diminuée en cas de cirrhose hépatique. **Surdosage :** l'expérience en cas de surdosage est limitée. Des crises comitales ont été rapportées. Pour informations complémentaires, se reporter au dictionnaire des spécialités pharmaceutiques. TABLEAU A - A.M.M. 331 009.5 (1988) gélules. **Prix :** 138,30 F (14 gélules). Remb. Séc. Soc. à 70%. Agréé aux collect. **Coût du traitement journalier :** 9,88 F



DISTA, une division des Laboratoires LILLY FRANCE S.A. - 203, Bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD - Tél. : (1) 49.11.34.34

<https://doi.org/10.1017/S0767399X00000146> Published online by Cambridge University Press